



Общество с ограниченной ответственностью

«Биолабмикс»

ИНН 5408278957 КПП 540801001
630090, Новосибирская обл., г. Новосибирск,
ул. Инженерная, дом № 28
Tel/Fax: +7(383)363-51-91, Tel: +7(383)363-22-40
E-mail: sales@biolabmix.ru

БиоМастер HS-qPCR Lo-ROX SYBR (2×)

Кат. номер MHR031-400, MHR031-2040

Описание:

Набор БиоМастер HS-qPCR Lo-ROX SYBR (2×) содержит 2× реакционную смесь БиоМастер HS-qPCR Lo-ROX SYBR (2×), 50 мМ раствор MgCl₂ и стерильную воду. 2× реакционная смесь БиоМастер HS-qPCR Lo-ROX SYBR (2×) предназначена для проведения количественной ПЦР в режиме реального времени с использованием флуоресцентного красителя SYBR Green I на амплификаторах, поддерживающих нормализацию данных по флуоресцентному красителю ROX. В состав БиоМастер HS-qPCR Lo-ROX SYBR (2×) входят все необходимые компоненты ПЦР (исключая ДНК-матрицу и праймеры):

- Высокопроцессивная рекомбинантная HS-Таq ДНК-полимераза;
- Смесь дезоксинуклеозидтрифосфатов;
- ПЦР-буфер;
- Mg²⁺ (3 мМ);
- SYBR Green I;
- Флуоресцентный краситель ROX;
- Инертный краситель.

Смесь оптимизирована для проведения эффективной и воспроизводимой ПЦР с "горячим" стартом в режиме реального времени с образцами геномной, плазмидной и вирусной ДНК. БиоМастер HS-qPCR Lo-ROX SYBR (2×) реакционная смесь содержит вещества, влияющие на температуры отжига праймеров и характеристики плавления матрицы, что позволяет повысить специфичность ПЦР и использовать матрицы со сложной пространственной структурой.

ДНК-полимераза, входящая в состав БиоМастер HS-qPCR Lo-ROX SYBR (2×), неактивна при комнатной температуре. Для её активации необходим прогрев реакционной смеси при 95 °C в течение 5 мин.

Инертный краситель в составе БиоМастер HS-qPCR Lo-ROX SYBR (2×) окрашивает её в голубой цвет и облегчает контроль за раскапыванием смеси при использовании многолуночных планшетов. Представленная форма набора для проведения ПЦР экономит время и снижает вероятность контаминации за счет малого числа шагов пипетирования. Низкое содержание магния в реакционной смеси и пробирка со 50 мМ раствором MgCl₂ позволяют

оптимизировать условия реакции под конкретную систему (праймеры/матрица).

Смесь идеально подходит для амплификаторов, обеспечивающих нормализацию сигнала по пассивному референсному красителю ROX: Life Technologies (ABI) 7500, 7500 Fast, ViA 7, QuantStudio 12K; Stratagene Mx4000, Mx3005P, Mx3000P.

Состав набора

| Каталожный номер | БиоМастер HS-qPCR Lo-ROX SYBR (2x) | 50 mM MgCl ₂ | Вода | Кол-во реакций по 25 мкл |
|------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|
| MHR031-400 | 4 × 1.25 мл | 1 × 1 мл | 4 × 1.25 мл | 400 |
| MHR031-2040 | 17 × 1.5 мл | 1 × 1,8 мл | 2 × 1,8 мл | 2040 |

Состав БиоМастер HS-qPCR Lo-ROX SYBR (2x):

100 mM Трис-НCl, pH 8.5, 100 mM KCl, 0.4 mM каждого нуклеозидтрифосфата, 3 mM MgCl₂, 0.12 ед. акт./мкл HS-Таq ДНК-полимеразы, 0,025% Tween 20, стабилизаторы HS-Таq ДНК-полимеразы, SYBR Green I, 60 нМ флуоресцентный краситель ROX и инертный краситель.

Область применения:

- ПЦР в режиме реального времени с использованием интеркалирующего красителя SYBR Green I;
- Обычная ПЦР;
- Высоковоспроизводимая ПЦР;
- Генотипирование.

Свойства полимеразы

Рекомбинантная Таq ДНК-полимераза обладает 5'-3' ДНК-зависимой полимеразной активностью и 5'-3' эхонуклеазной активностью нативной HS-Taq ДНК-полимеразы из *Thermus aquaticus*. Скорость продвижения Таq ДНК-полимеразы зависит от сложности ДНК-матрицы и составляет примерно 2 т.п.о./мин. Рекомбинантная HS-Taq ДНК-полимераза идеально подходит для стандартной ПЦР и ПЦР в режиме реального времени.

SYBR Green I

SYBR Green I – флуоресцентный интеркалирующий краситель для количественной и качественной детекции ПЦР-продуктов в ходе ПЦР в режиме реального времени. SYBR Green I обеспечивает простой и экономичный вариант для детекции и количественного определения ПЦР-продуктов в ходе ПЦР в режиме реального времени (ПЦР-РВ) без необходимости использования специфичных флуоресцентных зондов. В ходе амплификации краситель SYBR Green I встраивается в малую бороздку ДНК ПЦР-продуктов и испускает более сильный по сравнению с несвязанным красителем флуоресцентный сигнал. Максимумы поглощения и испускания SYBR Green I 494 нм и 521 нм,

соответственно, что позволяет использовать его со всеми известными на сегодняшний день приборами для проведения ПЦР в режиме реального времени.

Пассивный флуоресцентный краситель ROX

В состав смеси входит пассивный флуоресцентный краситель ROX, служащий внутренним стандартом для нормализации сигнала красителей, входящих в состав олигонуклеотидных зондов, при работе на ПЦР платформах, поддерживающих такую возможность (Applied Biosystems). ROX позволяет корректировать вариации между пробирками (лунками), возникающие из-за ошибок пипетирования, флюктуации флуоресценции. Присутствие ROX не оказывает влияния на протекание ПЦР и измерение уровня флуоресцентного сигнала, если смесь используется с другими ПЦР-платформами. Необходимо, однако, учитывать, что включение ROX в смесь ограничивает использование этого флуорофора для олигонуклеотидных зондов, а также других красителей, имеющих схожие спектральные характеристики ($E_m \sim 621\text{nm}$).

Инертный краситель

Инертный краситель в составе БиоМастер HS-qPCR Lo-ROX SYBR (2x) не снижает эффективность ПЦР и помогает контролировать процесс раскальвания многолуночных планшетов. Максимум абсорбции голубой краски соответствует 615 нм.

Свойства реакционной смеси

- Реакционная смесь неактивна при комнатной температуре благодаря технологии "горячий" старт и активируется после инкубации при 95 °C в течение 5 мин;
- Позволяет проводить нормировку по флуоресцентному красителю ROX;
- Смесь оптимизирована для специфичной работы HS-Тaq ДНК-полимеразы, длительного хранения (хранение БиоМастер HS-qPCR Lo-ROX SYBR (2x) в течение месяца при комнатной температуре не снижает эффективность ПЦР), многократного замораживания-размораживания.

Преимущества использования

- Фермент с "горячим" стартом повышает специфичность, чувствительность и выход реакции;
- Для активации HS-Тaq ДНК-полимеразы требуется не более 5 мин.;
- Смесь окрашена для облегчения раскальвания;
- Сокращается время на подготовку реакции;
- Снижается вероятность контаминации и ошибки при смешивании компонентов ПЦР;
- Возможность нормировки данных;
- Стандартизируются условия постановки однотипных реакций (снижается погрешность при смешивании компонентов ПЦР в разных экспериментах).

Ограничения к использованию

Не рекомендуется использовать для ПЦР в реальном времени с флуоресцентно-меченными зондами. Для таких приложений следует использовать наборы БиоМастер HS-qPCR Lo-ROX (2x) или БиоМастер UDG HS-qPCR Lo-ROX (2x).

Протокол проведения амплификации

1. Разморозить реакционную смесь и тщательно перемешать.
2. В тонкостенные пробирки для ПЦР добавить следующие компоненты из расчета объема одной реакционной смеси 25 мкл:

| Компонент | Объем | Конечная концентрация |
|------------------------------------|------------|-----------------------|
| БиоМастер HS-qPCR Lo-ROX SYBR (2x) | 12,5 | 1x |
| Прямой праймер | переменный | 0,1 – 600 нМ |
| Обратный праймер | переменный | 0,1 – 600 нМ |
| ДНК-матрица | переменный | 1 пг – 1 мкг |
| Стерильная вода | до 25 мкл | |

3. Осторожно перемешайте и сбросьте капли, используя центрифугу.
4. Провести ПЦР, используя рекомендованные ниже температурные условия:

| Шаг | Температура, °C | Время инкубации | Количество циклов |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|
| Предварительная денатурация | 95 | 5 мин | 1 |
| Денатурация | 95 | 5-15 сек | |
| Отжиг | 50-68 | 10-30 сек | 30-50 |
| Элонгация | 58-72 | 10-30 сек | |
| Кривая температур плавления (рекомендуемая) | 65-95 | | 1 |

5. Результат проведения ПЦР отображается в виде кривых амплификации.

Примечание. Мониторинг ПЦР в реальном времени можно проводить при 72 °C, в случае отсутствия неспецифических продуктов (праймер-димеров). Если образуются неспецифические продукты с Tm1 ниже, чем Tm2 целевого продукта, то мониторинг реакции проводят при температуре между Tm1 и Tm2

Условия хранения:

Хранение в месте, защищенном от попадания света: при +4°C – 3 месяца; при -20°C – 18 месяцев; не более 50 циклов замораживания-размораживания.

Условия транспортировки:

Транспортируется термоконтейнерах с охлаждающими элементами, допускается повышение температуры до температуры окружающей среды при транспортировке до 10 дней.